

* 2012年4月(第2版)
製造販売業者の住所変更に伴う改訂等
2006年8月作成
<貯法>
容器:気密容器
使用期限:外箱に表示

外皮用収斂・消炎剤
日本薬局方 酸化亜鉛
酸化亜鉛「コザカイ・M」

日本標準商品分類番号 872649
承認番号 16000AMZ04478000
薬価収載 1950.10
販売開始 1949.11
再評価結果 1979.2

(亜鉛華)
Zinc Oxide

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

1. 重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕
- *2. 患部が湿潤している場合〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕

【組成・性状】

本品1g中に、日本薬局方酸化亜鉛1gを含有する。
本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収斂・消炎・保護・緩和な防腐

【用法・用量】

外用散剤(散布剤)として15～100%
軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として2～60%
上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。

【使用上の注意】

(1) 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2) 適用上の注意

- 1) 誤って吸入しないように注意させること。
- 2) 眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

皮膚の蛋白質と結合して被膜を形成し、収斂、消炎、保護ならびに緩和な防腐作用を現す。
また、浸出液の吸収および分泌抑制により、創面または潰瘍面等を乾燥させる。

*【有効成分に関する理化学的知見】

一般名:酸化亜鉛、亜鉛華

化学名:Zinc Oxide

分子式:ZnO

分子量:81.38

性状:本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【包装】

500g

*【主要文献】

- 1) 第十六改正日本薬局方解説書(廣川書店)
- 2) JP DI 2011 日本薬局方医薬品情報2011(じほう)

*【文献請求先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1
TEL:0567-32-1431
FAX:0567-32-2961



発売元

中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

*製造販売元



小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9