

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<内用薬> アクレフ口腔粘膜吸収剤200μg アクレフ口腔粘膜吸収剤400μg アクレフ口腔粘膜吸収剤600μg アクレフ口腔粘膜吸収剤800μg	200μg 1本 400μg 1本 600μg 1本 800μg 1本	951.10 1,729.20 2,179.30 2,502.50	8219001K1028 8219001K2024 8219001K3020 8219001K4027	フェンタニルエン酸塩	田辺三菱	強壮剤、鎮痛剤を定時投与中の患者における突出痛の鎮痛	成人にはフェンタニルとして1回200μgより開始し、症状に応じて200μgずつ適宜漸増し、1回の突出痛に対してフェンタニルとして200、400、600又は800μgのいずれか1本を口腔粘膜上で溶解させて投与する。用量調節時に、1回の突出痛に対してフェンタニルとして200、400又は600μgのいずれか1本で十分な鎮痛効果が得られない場合には、投与終了15分後以降に同一用量の本剤を1本追加投与できるが、1回の突出痛に対して最大2本を限度とする。なお、本剤は1日当たり4回以下の突出痛に対する使用にとどめること。	8219	劇 麻 処方	未定
エディロールカプセル0.5μg エディロールカプセル0.75μg	0.5μg 1カプセル 0.75μg 1カプセル	68.50 98.80	3112006M1022 3112006M2029	エルテカシトル	中外 =大正富山	骨粗鬆症	成人にはエルテカシトルとして1日1回0.75μgを経口投与する。ただし、症状により適宜1日1回0.5μgに減量する。	3112	劇 処方	4月11日
シュアポスト錠0.25mg シュアポスト錠0.5mg	0.25mg 1錠 0.5mg 1錠	32.50 57.80	3969013F1020 3969013F2026	パグリチド	大日本住友	2型糖尿病における食後血糖推移の改善 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 ①食事療法・運動療法のみ ②食事療法・運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用	成人にはパグリチドとして1回0.25mgより開始し、1日3回毎食直前に経口投与する。維持用量は通常1回0.25～0.5mgで、必要に応じて適宜増減する。なお、1回量を1mgまで増量することができる。	3969	劇 処方	4月19日
ソニラス配合錠LD ソニラス配合錠HD	1錠 1錠	84.60 158.00	3969101F1025 3969101F2021	ピオグリタゾン塩酸塩 ・グリメグリド	武田	2型糖尿病 ただし、ピオグリタゾン塩酸塩及びグリメグリドの併用による治療が適切と判断される場合に限る。	成人には1日1回1錠(ピオグリタゾン/グリメグリドとして15mg/1mg又は30mg/3mg)を朝食前又は朝食後に経口投与する。	3969	劇 処方	5月以降
フェブリク錠10mg フェブリク錠20mg フェブリク錠40mg	10mg 1錠 20mg 1錠 40mg 1錠	31.10 56.40 106.60	3949003F1023 3949003F2020 3949003F3026	フェブキソタット	帝人ファーマ	痛風、高尿酸血症	成人にはフェブキソタットとして1日10mgより開始し、1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回40mgで、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日1回60mgとする。	3949	処方	5月中
プラザキサカプセル75mg プラザキサカプセル110mg	75mg 1カプセル 110mg 1カプセル	132.60 232.70	3339001M1024 3339001M2020	ダビガトランエキシレート メタンスルホン酸塩	ベリンガー	非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 なお、必要に応じて、ダビガトランエキシレートとして1回110mg(110mgカプセルを1カプセル)を1日2回投与へ減量すること。	成人にはダビガトランエキシレートとして1回150mg(75mgカプセルを2カプセル)を1日2回経口投与する。	3339	処方	3月14日
メマリー錠5mg メマリー錠10mg メマリー錠20mg	5mg 1錠 10mg 1錠 20mg 1錠	133.90 239.20 427.50	1190018F1023 1190018F2020 1190018F3026	マンチン塩酸塩	第一三共	中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	成人にはマンチン塩酸塩として1日1回5mgから開始し、1週間に5mgずつ増量し、維持量として1日1回20mgを経口投与する。	119	劇 処方	3月18日
レミニール錠4mg レミニール錠8mg レミニール錠12mg レミニールOD錠4mg レミニールOD錠8mg レミニールOD錠12mg レミニール内用液4mg/mL	4mg 1錠 8mg 1錠 12mg 1錠 4mg 1錠 8mg 1錠 12mg 1錠 0.4% 1mL	119.60 213.80 271.00 119.60 213.80 271.00 107.30	1190019F1028 1190019F2024 1190019F3020 1190019F4027 1190019F5023 1190019F6020 1190019S1026	ガラントミン 臭化水素酸塩	ヤンセンファーマ =武田	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	成人にはガラントミンとして1日8mg(1回4mgを1日2回)から開始し、4週間後に1日16mg(1回8mgを1日2回)に増量し、経口投与する。なお、症状に応じて1日24mg(1回12mgを1日2回)まで増量できるが、増量する場合は変更前の用量で4週間以上投与した後に増量する。	119	劇 処方	3月22日

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<注射薬> アリクストラ皮下注5mg アリクストラ皮下注7.5mg	5mg0.4mL 1筒 7.5mg0.6mL 1筒	3,380.00 4,423.00	3339400G3021 3339400G4028	フォンダ [®] ハ [®] リスナトリウム	グラク [®] ・ スミスクライン	急性肺血栓塞栓症及び急性深部 静脈血栓症の治療	詳細は添付文書をご覧ください。	3339	処方	3月11日
ステラ [®] ラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL 1筒	426,552.00	3999431G1025	ウステキヌマブ [®] (遺伝子組換え)	ヤンセンファーマ	既存治療で効果不十分な下記疾 患 尋常性乾癬、関節症性乾癬	詳細は添付文書をご覧ください。	3999	生物 劇 処方	3月14日
ビダーザ注射用100mg	100mg 1瓶	49,993.00	4291419D1026	アサ [®] シチジン	日本新薬	骨髄異形成症候群	詳細は添付文書をご覧ください。	429	劇 処方	3月11日
ロミプレート皮下注250 μ g 調製用	250 μ g 1瓶	67,972.00	3999430D1024	ロミプ [®] ロシチム (遺伝子組換え)	協和発酵 キリン	慢性特発性血小板減少性紫斑病	詳細は添付文書をご覧ください。	3999	処方	4月中
<外用薬> オルベスコ100 μ g インヘラー56吸入用	5.6mg3.3g 1キット	1,835.60	2290702G4024	シクレリド [®]	帝人ファーマ	気管支喘息 成人:成人にはシクレリド [®] として 100~400 μ gを1日1回吸入投与する。なお、症状により適宜増減す るが、1日の最大投与量は800 μ gとする。また、1日に800 μ gを投与 する場合は、朝、夜の1日2回に分けて投与する。 小児:小児にはシクレリド [®] として100~200 μ gを1日1回吸入投与す る。なお、良好に症状がコントロールされている場合は50 μ g1日1回まで 減量できる。	成人:成人にはシクレリド [®] として 100~400 μ gを1日1回吸入投与する。なお、症状により適宜増減す るが、1日の最大投与量は800 μ gとする。また、1日に800 μ gを投与 する場合は、朝、夜の1日2回に分けて投与する。 小児:小児にはシクレリド [®] として100~200 μ gを1日1回吸入投与す る。なお、良好に症状がコントロールされている場合は50 μ g1日1回まで 減量できる。	229	処方	4月中

薬価基準適用外品目

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<内用薬> ノルレボ錠0.75mg	0.75mg 1錠	—	—	レボ [®] ノルゲストレル	そーせい =あすか	緊急避妊	性交後72時間以内にレボ [®] ノルゲスト レルとして1.5mgを1回経口投与す る。	254		5月中旬

*1 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社は販売会社であることを示します(従来のハイフン表記は平成17年4月の改正薬事法施行を機に廃止しました)。

*2 一部省略してありますので詳細は添付文書等をご確認ください。