

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<内用薬> アルタットカプセル37.5mg アルタットカプセル75mg アルタット細粒20%	37.5mg 1カプセル 75mg 1カプセル 20% 1g	27.30 44.60 118.90	2325004M2067 2325004M1087 2325004C1022	ロキサジン 酢酸エステル塩酸塩	あすか =武田	・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆流性食道炎、麻酔前投薬 ・下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期	詳細は添付文書をご覧ください。	2325	—	未定
ストラテラカプセル40mg	40mg 1カプセル	448.40	1179050M4022	アトキセチン塩酸塩	日本 イライリ	小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)	小児にはアトキセチンとして1日0.5mg/kgより開始し、その後1日0.8mg/kgとし、さらに1日1.2mg/kgまで増量した後、1日1.2~1.8mg/kgで維持する。ただし、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこととし、いずれの投与量においても1日2回に分けて経口投与する。 なお、症状により適宜増減するが、1日量は1.8mg/kg又は120mgのいずれか少ない量を超えないこと。	1179	劇 処方	未定
ホスレノール顆粒分包 250mg ホスレノール顆粒分包 500mg	250mg 1包 500mg 1包	194.10 284.80	2190029D1025 2190029D2021	炭酸ランタン水和物	パイル	下記患者における高リ血症の改善 透析中の慢性腎不全患者	成人にはランタンとして1日750mgを開始用量とし、1日3回に分割して食直後に経口投与する。以後、症状、血清リ濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日2,250mgとする。	219	処方	5月31日
<外用薬> エリザス点鼻粉末 200μg28噴霧用	5.6mg 1瓶	1,758.40	1329712R1021	デキサメタゾン シハシル酸エステル	日本新薬	アレルギー性鼻炎	成人には1日1回、各鼻腔に1噴霧ずつ(1噴霧あたりデキサメタゾンシハシル酸エステルとして200μg)投与する。	1329	処方	6月5日
ル・エストロジェル0.06%	0.06% 1g	27.80	2473700M2026	エストラジオール	資生堂 =富士製薬	更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う 血管運動神経症状(Hot flush及び発汗)	成人に対しル・エストロジェル270押し(1.8g、エストラジオールとして1.08mg含有)を1日1回、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦する。なお、症状に応じて、適宜減量する。減量する場合は、ル・エストロジェル170押し(0.9g、エストラジオールとして0.54mg含有)を1日1回、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦する。	2473	処方	6月4日

\*1 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社は販売会社であることを示します(従来のハイファン表記は平成17年4月の改正薬事法施行を機に廃止しました)。

\*2 一部省略してありますので詳細は添付文書等をご確認ください。