

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<内用薬> アコフアイト錠100mg	100mg 1錠	36.20	2399015F1020	アコフアイト 塩酸塩 水和物	ゼリア新薬 =アステラス	機能性ディスペプシアにおける食 後膨満感、上腹部膨満感、早期 満腹感	成人にはアコフアイト 塩酸塩水和物として 1回100mgを1日3回、食前に経口投与す る。	2399	処方	6月6日
イノベロン錠100mg イノベロン錠200mg	100mg 1錠 200mg 1錠	79.70 130.40	1139012F1023 1139012F2020	ルフィメド	イーザイ	他の抗てんかん薬で十分な効 果が認められないLennox- Gastaut症候群における強直発 作及び脱力発作に対する抗て んかん薬との併用療法	<4歳以上の小児> 体重15.0~30.0kgの場合:ルフィメドとし て、最初の2日間は1日200mgを1日2回 に分けて食後に経口投与し、その後は 2日ごとに1日用量として200mg以下ず つ漸増する。維持用量は1日1000mgとし、1日2回に分けて食後に経口投 与する。なお、症状により、1日1000mgを超えない範囲で適宜増減する が、増量は2日以上の間隔をあけて1日用量として200mg以下ずつ行うこ と。 体重30.1kg以上の場合:成人の用法・用量に従う。 <成人> ルフィメドとして、最初の2日間は1日400mgを1日2回に分けて食後に経口 投与し、その後は2日ごとに1日用量として400mg以下ずつ漸増する。維 持用量は体重30.1~50.0kgの患者には1日1800mg、体重50.1~70.0kgの 患者には1日2400mg、体重70.1kg以上の患者には1日3200mgとし、1日2回 に分けて食後に経口投与する。なお、症状により維持用量を超えない範 囲で適宜増減するが、増量は2日以上の間隔をあけて1日用量として 400mg以下ずつ行うこと。	113	処方	5月29日
オングリザ錠2.5mg オングリザ錠5mg	2.5mg 1錠 5mg 1錠	110.20 166.00	3969017F1028 3969017F2024	サキサグリブチン 水和物	協和発酵 キリン	2型糖尿病	成人にはサキサグリブチンとして5mgを1日 1回経口投与する。 なお、患者の状態に応じて2.5mgを1日 1回経口投与することができる。	3969	処方	未定
スチパーガ錠40mg	40mg 1錠	5,424.30	4291029F1028	レゴラフェニブ 水和物	ハニエル	治癒切除不能な進行・再発の結 腸・直腸癌	成人にはレゴラフェニブとして1日1回160mg を食後に3週間連日経口投与し、その後 1週間休薬する。これを1サイクルとして投 与を繰り返す。なお、患者の状態により 適宜減量する。	4291	劇 処方	5月24日
ゼルヤンツ錠5mg	5mg 1錠	2,539.00	3999034F1020	トファシチンブ クエン酸塩	ファイザ =武田	既存治療で効果不十分な関節リ ウマチ	トファシチンブとして1回5mgを1日2回経口投 与する。	399	劇 処方	未定
ノウリアスト錠20mg	20mg 1錠	760.70	1169016F1020	イストラテフィリン	協和発酵 キリン	レボドパ含有製剤で治療中の パーキンソン病におけるウェアリング 現象の改善	本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。 成人にはイストラテフィリンとして20mgを1日 1回経口投与する。なお、症状により 40mgを1日1回経口投与できる。	1169	処方	5月30日
レグテクト錠333mg	333mg 1錠	50.10	1190022H1020	アカンプロサートカルシウム	日本新薬	アルコール依存症患者における断酒 維持の補助	成人にはアカンプロサートカルシウムとして666mg を1日3回食後に経口投与する。	119	処方	5月27日

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<注射薬> アクテムラ皮下注162mg シリンジ	162mg0.9mL 1筒	38,056.00	6399421G1022	トリスマブ (遺伝子組換え)	中外	既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)	成人には、トリスマブ(遺伝子組換え)として1回162mgを2週間隔で皮下注射する。	6399	生物 劇 処方	5月24日
アクテムラ皮下注162mg オートインジェクター	162mg0.9mL 1キット	38,200.00	6399421G2029							
アーゼラ点滴静注液 100mg	100mg5mL 1瓶	27,590.00	4291423A1026	オファツムマブ (遺伝子組換え)	ゲラクソ・ スミスクライン	再発又は難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病	成人には週1回、オファツムマブ(遺伝子組換え)として、初回は300mg、2回目以降は2000mgを点滴静注し、8回目まで投与を繰り返す。8回目の投与4~5週後から、4週間に1回2000mgを点滴静注し、12回目まで投与を繰り返す。	4291	生物 劇 処方	5月24日
アーゼラ点滴静注液 1000mg	1000mg50mL 1瓶	267,502.00	4291423A2022							
エボルトラ点滴静注20mg	20mg20mL 1瓶	140,248.00	4229403A1022	カファラビン	サノフィ	再発又は難治性の急性リンパ性白血病	カファラビンとして52mg/m ² (体表面積)を1日1回2時間以上かけて点滴静注する。これを5日間連日投与し、少なくとも9日間休薬する。これを1ケルとして繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	422	劇 処方	未定
ノーモサング点滴静注 250mg	250mg10mL 1管	101,273.00	6349400A1026	ヘミン	ジミック =オファン パシフィック (予定)	急性ホルフィリン症患者における急性発作症状の改善	ヘミンとして3mg/kgを1日1回、4日間点滴静注する。ただし、1日あたりの投与量は250mgを超えないこと。	634	劇 処方	未定
ブラリア皮下注60mg シリンジ	60mg1mL 1筒	28,482.00	3999435G1023	デノスマブ (遺伝子組換え)	第一三共	骨粗鬆症	成人にはデノスマブ(遺伝子組換え)として60mgを6カ月に1回、皮下投与する。	3999	生物 劇 処方	6月11日
ボルベン輸液6%	6%500mL 1袋	970.00	3319408A1020	ヒドロキシethyl デンプン130000	フレニウス カービシヤパン	循環血液量の維持	持続的に静脈内投与する。投与量及び投与速度は、症状に応じ適宜調節するが、1日50mL/kgを上限とする。	3319	処方	未定
メトレレプチン皮下注用 11.25mg「シオノギ」	11.25mg 1瓶	33,877.00	2499414D1023	メレルプチン (遺伝子組換え)	塩野義	脂肪萎縮症	メレルプチンとして、男性には0.04mg/kg、18歳未満の女性には0.06mg/kg、18歳以上の女性には0.08mg/kgを1日1回皮下注射する。投与はそれぞれ0.02mg/kg、0.03mg/kg、0.04mg/kgから投与開始し、1ヵ月程度をかけ、上記投与量まで増量する。なお、症状に応じて適宜減量する。	2499	処方	未定
<外用薬> ネオキシテープ73.5mg	73.5mg 1枚	189.40	2590700S1025	オキシブチン塩酸塩	久光 =旭化成 ファーマ	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	成人に対し本剤1日1回、1枚(オキシブチン塩酸塩として73.5mg)を下腹部、腰部又は大腿部のいずれかに貼付し、24時間毎に貼り替える。	259	—	未定

薬価基準適用外品目

品目	規格・単位	薬価	薬価基準収載 医薬品コード	一般名	会社名*1	効能・効果	用法・用量*2	分類	規制	発売予定
<注射薬> 沈降インフルエンザ ワクチンH5N1「生研」1mL	30μg1mL 1本	—	—	沈降インフルエンザ ワクチン(H5N1株)	テノカ生研	新型インフルエンザ(H5N1)の予防	0.5mLをおよそ3週間の間隔において、筋肉内もしくは皮下に2回注射する。	6313	生物 劇 処方	未定

*1 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社は販売会社であることを示します。

*2 一部省略してありますので詳細は添付文書等をご確認下さい。