

その他の滋養強壮薬  
**日本薬局方 ブドウ酒**  
Wine

貯 法：遮光し、室温保存  
なるべく涼しい所に保管し、  
開封後はなるべく速やかに使用して下さい。  
使用期限：詰替日より3年

許可番号	23A2X00053
薬価収載	1991年5月
販売開始	1991年12月

**【禁忌(次の患者には投与しないこと)】**

\* ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

**【組成・性状】**

**組成**

本品1mL中に日本薬局方ブドウ酒1mLを含む。  
本品はブドウ *Vitis vinifera* Linné (*Vitaceae*) 又はその他の品変種の果実を発酵して得た果実酒である。  
本品はエタノール11vol%以上、14vol%未満(比重による)を含む。  
本品は酸化防止剤としてピロ亜硫酸カリウムを含む。  
本品は合成甘味料及び合成着色料を含まない。

**製剤の性状**

本品は帯赤紫色～赤紫色の液で、特異な芳香があり、味はわずかに渋く、やや刺激性である。  
比重 $d_{20}^{20}$ : 0.990～1.010

**【効能・効果】**

食欲増進、強壮、興奮  
下痢  
不眠症  
無塩食事療法

**【用法・用量】**

通常、成人1回1食匙(15mL)又は1酒杯(60mL)を経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。  
また、リモナーデ剤や滴剤の佐薬にも用いる。

**【使用上の注意】**

**1. 重要な基本的注意**

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起ることがあるので、本剤投与中の患者には**自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないよう十分に注意**すること。

**2. 相互作用**

(1) **併用禁忌**(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* ジスルフィラム ノックピン シアナミド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2) **併用注意**(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

・本剤はアルコールを含有するので、他の薬剤の作用を増強又は減弱するおそれがある。

**3. 高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

**4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

妊娠中又は授乳中には投与しないことが望ましい。[妊娠中又は授乳中の投与に関する安全性は確立していない。]

**5. 小児等への投与**

小児等に対する安全性は確立していないので投与しないこと。[アルコールにより副作用等を起こすおそれがある。]

**6. その他の注意**

本剤はアルコール製剤であるため、投与に際しては、注意すること。

**【包装】**

500mL

**\*\*【主要文献】**

1) 第十六改正日本薬局方

**【文献請求先】**

\* 中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1  
TEL 0567-32-1431  
FAX 0567-32-2961

製造販売元