

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方

ブドウ酒

【特徴】

- (1) 本剤はブドウの果実を発酵して得た赤ブドウ酒です。
- (2) 本剤は合成甘味料および合成着色料を含みません。
- (3) 本剤は赤紫色の液で、特異な芳香があり、味はわずかに渋く、やや刺激性があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 手術や出産直後の人。（血行を促進するため）
- * (2) 乗り物又は機械類の運転作業や危険な作業を行う人。（アルコールを含有するため）

🗨 相談すること

* 1. 次の人は使用前に、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) アルコールに過敏な人。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

* 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

* 3. 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

食欲増進、強壮、興奮
下痢
不眠症
無塩食事療法

【用法及び用量】

通常、成人1回1食匙(15mL)又は1酒杯(60mL)を服用する。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) ビンから直接服用しないでください。

【成分及び分量】

本剤1mL中に日本薬局方ブドウ酒1mLを含む。

** 本剤はエタノール11.0～14.0vol%及び酒石酸0.10～0.40w/v%を含む。

酸化防止剤としてピロ亜硫酸カリウムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。

- * (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (5) 使用の都度ビンのキャップをしっかりと締めてください。

【包装】

500mL、120mL

【お問い合わせ先】

- * (1) 購入した薬局・薬店
- (2) 中北薬品株式会社 製薬工場事業部
電話 0567-32-1431
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日及び弊社指定休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)